



**Indicazioni operative per i percorsi da attivare in ospiti ed operatori delle strutture residenziali in base alla clinica, all'esito dei test sierologici e/o degli esami molecolari (tamponi)**


**OSPITE ASINTOMATICO con esito esame sierologico IgM + (IgM+/IgG+; IgM+/IgG-)**




# OSPITE SINTOMATICO<sup>1</sup>



## OPERATORE ASINTOMATICO con esito esame sierologico IgM + (IgM+/IgG+; IgM+/IgG-)



# OPERATORE SINTOMATICO<sup>1</sup>



# Note:

<sup>1</sup>Sintomi suggestivi di malattia da COVID-19: febbre, tosse e difficoltà respiratorie

<sup>2</sup>E' necessario saggiare i primi individui [N.=2-4] sintomatici nelle comunità chiuse per identificare i focolai, mettere in atto le azioni di controllo e contrasto.

Tutti gli altri individui che presentano sintomi in contesti chiusi in cui si sia confermato uno o più casi possono essere considerati casi probabili e isolati senza ulteriori test.

Considerare il test molecolare per i pazienti da sottoporre a trattamento.

<sup>3</sup>Per la gestione dell'operatore sanitario si seguano le raccomandazioni attualmente vigenti.

In relazione alla valutazione del rischio di esposizione, le raccomandazioni possono essere estese a personale non sanitario